


# Stabilis



## Cabazitaxel















Noms commerciaux

|             |  |
|-------------|--|
| Cabazil     | Argentine  |
| Cabazitaxel | Allemagne, Danemark, Espagne, Finlande   |
| Cecalter    | Argentine  |
| Jevtana     | Allemagne, Argentine, Australie, Belgique, Brésil, Canada, Chili, Colombie, Danemark, Equateur, Espagne, Etats Unis d'Amérique, Finlande, France, Grande Bretagne, Islande, Italie, Malaisie, Mexique, Norvège, Pérou, Roumanie, Slovénie, Suisse, Turquie |
| Proazitax   | Brésil   |
| Xatiza      | Chili  |
| Zitat       | Argentine  |



### Stabilité des solutions

|  |  | 10 mg/ml           | 4°C   |  | 28 |  |  | 3804 |
|--|--|--------------------|-------|--|----|--|--|------|
|  |  | 10 mg/ml           | -20°C |  | 49 |  |  | 4800 |
|  |  | 20 mg/ml           | 25°C  |  | 28 |  |  | 4761 |
|  |  | 0,1 >> 0,26 mg/ml  | 25°C  |  | 28 |  |  | 4761 |
|  |  | 0,1 >> 0,26 mg/ml  | 2-8°C |  | 28 |  |  | 4761 |
|  |  | 0,1 mg/ml          | -20°C |  | 49 |  |  | 4800 |
|  |  | 0,1 mg/ml          | 25°C  |  | 21 |  |  | 4800 |
|  |  | 0,1 mg/ml          | 4°C   |  | 21 |  |  | 4800 |
|  |  | 0,1 >> 0,26 mg/ml  | 25°C  |  | 28 |  |  | 4761 |
|  |  | 0,10 >> 0,26 mg/ml | 2-8°C |  | 48 |  |  | 3237 |
|  |  | 0,10 >> 0,26 mg/ml | 25°C  |  | 8  |  |  | 3237 |
|  |  | 0,26 mg/ml         | -20°C |  | 49 |  |  | 4800 |
|  |  | 0,26 mg/ml         | 25°C  |  | 21 |  |  | 4800 |

|   |   |            |      |   |    |   |  |  |      |
|---|---|------------|------|---|----|---|--|--|------|
|   |   | 0,26 mg/ml | 4°C  |   | 21 |   |  |  | 4800 |
|  |  | 0,15 mg/ml | 25°C |  | 28 |  |  |  | 3804 |
|  |  | 0,15 mg/ml | 4°C  |  | 28 |  |  |  | 3804 |



### Facteur influençant la stabilité



### Voie d'administration





































### Bibliographie

|      | Type        | Source   |
|------|-------------|--|
| 3237 | Laboratoire | Cabazitaxel (Jevtana®) - Résumé des caractéristiques du produit.<br>Sanofi Aventis France 2011   |
| 3804 | Revue       | Lazzarini R, Salvadori S, Trapella C, Guerrini R, Marzola E, Pasini G, Dalpiaz A.<br>Physicochemical stability of cabazitaxel and docetaxel solutions.<br>EJHP 2014 ;22:150-155.   |
| 4761 | Revue       | D&#39;Huart E, Sacrez M, Vigneron J, Demoré B.<br>Physicochemical stability of Cabazitaxel Zentiva® solution in vials after opening and diluted- solutions in three infusion bags.<br>Pharmaceutical Technology in Hospital Pharmacy 2023 ; 8(1): 20220009 |
| 4800 | Poster      | H Ma N, Law S, Walker S.<br>Stability of Dr.Reddy's Cabazitaxel Following Reconstitution with Manufacturer's Diluent & Dilution with Sodium Chloride and Dextrose 5% in non-PVC non-DEHP bags and Original Glass Vials at 25°C, 4°C and -20°C.<br><br>2023 |



# Dictionnaire

|   |   |
|---|---|
|  Anticancéreux                     |  Injectable                |
|  Noms commerciaux                  |  Stabilité des solutions   |
|  Contenant                         |  Molécule                  |
|  Concentration                     |  Température               |
|  Conservation                      |  Durée de stabilité        |
|  Biosimilaire                      |  Données conflictuelles    |
|  Bibliographie                     |  Verre                     |
|  Aucun                             |  A l'abri de la lumière    |
|  Jour                              |  Solvant spécifique        |
|  Non précisée                      |  Flacon entamé             |
|  Polyéthylène                      |  NaCl 0,9% ou glucose 5%   |
|  Polypropylène                     |  Polyolefine               |
|  Heure                             |  Chlorure de sodium 0,9%   |
|  Facteur influençant la stabilité |  Polyvinyl chlorure       |
|  Provoque                        |  Relargage               |
|  Voie d'administration           |  Perfusion intraveineuse |
|  Bibliographie                   |  Dictionnaire            |