Stabilis

Cetuximab

Noms commerciaux

Erbitux	Afrique du sud, Allemagne, Argentine, Australie, Autriche, Belgique, Canada, Chili, Colombie, Danemark, Equateur, Espagne, Etats Unis d'Amérique, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Inde, Iran, Irlande, Islande, Italie, Japon, Luxembourg, Malaisie, Mexique, Norvège, Nouvelle Zélande, Pays bas, Pérou, Pologne, Roumanie, Suède, Suisse, Turquie, Vénézuela

Stabilité des solutions

	∅	5 mg/ml	-20°C		72			2220
	∅	5 mg/ml	2-8°C		1461			2220
	∅	5 mg/ml	25°C		72			2220
	∅	5 mg/ml	25°C	?	3			4755
PVC	▲	0.45 >> 5 mg/ml	25°C		48			2220
PE	▲	0.45 >> 5 mg/ml	25°C		48			2220
PP	▲	0.45 >> 5 mg/ml	25°C		48			2220
PP	∅	5 mg/ml	25°C	?	3			4755
PP	∅	5 mg/ml	4°C	?	90			4755
POF	▲	1 mg/ml	25°C	?	3			4755
POF	▲	1 mg/ml	4°C	?	90			4755
EVA	▲	0.45 >> 5 mg/ml	25°C		48			2220

Facteur influençant la stabilité

	> 25°C				2220

Compatibilités

	Cetuximab Temocilline		2296

Voie d'administration

Bibliographie

	Type	Source
2220	Laboratoire	Cétuximab (Erbitux®) - Dossier scientifique Merck Serono 2015
2296	Laboratoire	Témocilline (Negaban®) - Résumé des caractéristiques du produit Eumedica 2017
4755	Revue	Vieillard V, Le Guyader G, Jallades A, Astier A. Extended physicochemical stability of cetuximab in opened vials and infusion bags when stored at 4°C and 25°C. J Oncol Pharm Practice 2023

Dictionnaire

	Anticancéreux		Injectable
	Noms commerciaux		Stabilité des solutions
	Contenant		Molécule
	Concentration		Température
	Conservation		Durée de stabilité
	Biosimilaire		Données conflictuelles
	Bibliographie		Verre
	Aucun		Lumière
	Heure		Jour
	Flacon entamé		Non précisée
PVC	Polyvinyl chlorure		Chlorure de sodium 0,9%
PE	Polyéthylène	PP	Polypropylène
POF	Polyolefine	EVA	Ethylène vinyl acétate
	Facteur influençant la stabilité		Provoque
	Dégradation		Compatibilités
	Molécule		Solvant
	Incompatibilité non précisée		Incompatible
	Voie d'administration		Perfusion intraveineuse
	Bibliographie		Dictionnaire