


Stabilis



Enoxaparin sodium











Noms commerciaux

Bolentax	Mexique
Clasina	Colombie
Clenox	Colombie, Pérou
Clexan	Grèce
Clexane	Afrique du sud, Allemagne, Arabie Saoudite, Argentine, Australie, Belgique, Brésil, Chili, Colombie, Croatie, Egypte, Emirats Arabes Unis, Espagne, Grande Bretagne, Iran, Irlande, Japon, Luxembourg, Mexique, Nouvelle Zélande, Pays bas, Pérou, Pologne, Roumanie, Suisse, Turquie, Vénézuéla
Cutenox	Pérou
Dilutol	Argentine, Equateur
Dynalin	Inde
Enoparin	Vénézuéla
Enoxalon	Chili
Enoxanorth	Argentine
Enoxatal	Colombie
Hemofagin	Chili
Heptron	Brésil
Inhixa	Allemagne
Klexane	Danemark, Finlande, Norvège, Suède
Lorapine	Argentine
Lovenox	Autriche, Canada, Etats Unis d'Amérique, France
Lowparin	Colombie
Nurox	Chili










Stabilité des solutions

?	?	[]	- +	?	?	?	!	?
		20 mg/ml	22°C-26°C	?	28			1893
		1,2 mg/ml	20°C-22°C		48			311
		20 mg/ml	2-6°C		14			1893
		20 mg/ml	22°C-26°C	?	14			1893

		8 mg/ml	2-6°C		14			4413
		100 mg/ml	3°C		10			811



Compatibilités

				
		Enoxaparin sodium Gentamicin sulfate		3643
		Enoxaparin sodium : 100 mg/ml Temocilline : 83.33 mg/ml		2231



Voie d'administration





































Bibliographie

	Type	Source
311	Revue	Newborn AL, Kessler JM, Joyner KA. Compatibility and activity of enoxaparin sodium in 0.9% sodium chloride injection for 48 hours. Am J Health-Syst Pharm 1996 ; 53: 167-169.
811	Revue	Charland SL, Davis DD, Tillman DJ. Activity of enoxaparin sodium in tuberculin syringes for 10 days. Am J Health-Syst Pharm 1998 ; 55: 1296-1298.
1893	Revue	Dager WE, Gosselin RC, King JF, Christensen CL, Owings JT, Larkin EC. Anti-Xa stability of diluted enoxaparin for use in pediatrics. Ann Pharmacotherapy 2004 ; 38: 569-573.
2231	Revue	de Jongh R, Hens R, Basma V, mouton JW, Tulkens PM, Carryn S. Continuous versus intermittent infusion of temocillin, a directed spectrum penicillin for intensive care patients with nosocomial pneumonia: stability, compatibility, population pharmacokinetic studies and breakpoint selection. J Antimicrob Chemother 2008 ; 61, 2: 382-388.
3643	Laboratoire	Gentamicin sulphate (Cidomycin®) - Summary of Product Characteristics Sanofi 2015
4413	Revue	Moffett B.S, Dinh K, Placencia J, Pelkey G, Rocky Hui S-K, Teruya J. Stability and Sterility of Enoxaparin 8 mg/mL Subcutaneous Injectable Solution. J Pediatr Pharmacol Ther 2016 ; 21, 4: 322-326.



Dictionnaire

 Anticoagulant	 Injectable
 Noms commerciaux	 Stabilité des solutions
 Contenant	 Molécule
 Concentration	 Température
 Conservation	 Durée de stabilité
 Biosimilaire	 Données conflictuelles
 Bibliographie	 Verre
 Eau pour préparation injectable	 Non précisée
 Jour	 Polyvinyl chlorure
 Chlorure de sodium 0,9%	 Lumière
 Heure	 Seringue polypropylène
 A l'abri de la lumière	 Aucun
 Compatibilités	 Molécule
 Solvant	 Incompatibilité non précisée
 Incompatible	 Compatible
 Voie d'administration	 Sous cutanée
 Bibliographie	 Dictionnaire