

Stabilis



Epoetin alfa



Noms commerciaux

Abseamed	Allemagne, Danemark, Suisse
Binocrit	Allemagne, Autriche, Finlande, France, Grande Bretagne, Pays bas, Suède, Suisse
Biopoin	Allemagne
Dynepo	Allemagne
Epogen	Argentine, Etats Unis d'Amérique
Eporatio	Allemagne
Eprex	Afrique du sud, Belgique, Canada, Croatie, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grande Bretagne, Grèce, Italie, Norvège, Pays bas, Pologne, Portugal, Slovénie, Suède, Suisse, Thaïlande, Turquie
Erypo	Autriche
Espo	Japon
Hemax	Argentine
Hypercrit	Argentine
Procrit	Etats Unis d'Amérique
Silapo	Allemagne



Stabilité des solutions

PP		100 UI/ml	25°C	?	3			798
?		20000 UI/ml	2-8°C	?	42			1804
?		5000 UI/ml	30°C	?	84			304
?		5000 UI/ml	5°C		84			304



Voie d'administration





Bibliographie

	Type	Source
304	Revue	Corbo DC, Suddith RL, Sharma B, Naso RB. Stability, potency, and preservative effectiveness of epoetin alfa after addition of a bacterostatic diluent. Am J Hosp Pharm 1992 ; 49: 1455-1458.
798	Revue	Widness JA, Schmidt R. Epoetin alfa loss with NaCl 0.9% dilution. Ann Pharmacotherapy 1996 ; 30: 1501-1502.
1804	Revue	Naughton CA, Duppong LM, Forbes KD, Sehgal I. Stability of multidose, preserved formulation epoetin alfa in syringes for three and six weeks. Am J Health-Syst Pharm 2003 ; 60: 464-468.



Dictionnaire

 Divers	 Injectable
 Noms commerciaux	 Stabilité des solutions
 Contenant	 Molécule
 Concentration	 Température
 Conservation	 Durée de stabilité
 Biosimilaire	 Données conflictuelles
 Bibliographie	 Polypropylène
 Chlorure de sodium 0,9%	 Non précisée
 Heure	 Non précisé
 Aucun	 Jour
 NaCl 0,9% + bactériostatique	 A l'abri de la lumière
 Voie d'administration	 Intraveineuse
 Sous cutanée	 Bibliographie
 Dictionnaire	