


Stabilis



Hydroquinone



Stabilité des préparations

									
		800 mg ® = ?	Cleoderm® >> 40 g	15-30 °C		90 			4879
		4000 mg ® = ?	Cleoderm® >> 40 g	15-30 °C		180 			4879



Stabilité en mélange

	Ethoxydiglycol 4000 mg Butylhydroxytoluène 20 mg Métabisulfite de sodium 160 mg Cleoderm® >> 40 g	15-30 °C		Hydrocortisone : Poudre ® = ? 400 mg Tretinoin : Poudre ® = ? 5 mg	14	4931



Bibliographie

	Type	Source
4879	Revue	Marianni B, Mansourian M, Koulouridas S, Polonini H. Compatibility of Active Pharmaceutical Ingredients in Cleoderm: A Comprehensive Study for Enhanced Topical Dermatological Treatments. Int J Pharm Compound 2024 ;28,5:413-422
4931	Revue	Marianni B, Costa Vicente Silva C, Polonini H. Compatibility of Active Pharmaceutical Ingredients Combinations Compounded in Cleoderm, a Cream Base for Personalized Dermatological Treatments. Int J Pharm Compound 2025 ;29,2:150-162



Dictionnaire

 Divers	 Forme dermique
 Stabilité des préparations	 Contenant
 Origine	 Excipient
 Température	 Conservation
 Durée de stabilité	 Biosimilaire
 Données conflictuelles	 Bibliographie
 Flacon plastique	 Poudre
 A l'abri de la lumière	 Jour
 Stabilité en mélange	 Molécule
 Bibliographie	 Dictionnaire