


Stabilis



Infliximab



Εμπορική ονομασία

Flixabi	Βέλγιο, Γερμανία, Ισπανία, Μεγάλη Βρετανία
Flixceli	Περου
Inflectra	Βέλγιο, Γερμανία, Ελβετία, Ισλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Καναδάς, Μεγάλη Βρετανία, Ρουμανία
Infliximab	Χιλή
Ixifi	Χιλή
Remicade	Υhdistyneet arabiemiirikunnat, Αργεντινή, Αυστραλία, Αυστρία, Βέλγιο, Βενεζουέλα, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Εκουαδόρ, Ελβετία, Ελλάδα, Η.Π.Α., Ιαπωνία, Ιράν, Ιρλανδία, Ισλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Καναδάς, Κολομβία, Λουξεμβούργο, Μαλαισία, Μεγάλη Βρετανία, Μεξικό, νέα Ζηλανδία, Νορβηγία, Ολλανδία, Περου, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σαουδική Αραβία, Σουηδία, Τουρκία, Τυνησία, Φινλανδία, Χιλή
Remsima	Αργεντινή, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Εκουαδόρ, Ελβετία, Ισλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Καναδάς, Μεγάλη Βρετανία, Νορβηγία, Περου, Ρουμανία, Τουρκία, Χιλή
Zessli	Βέλγιο, Γερμανία, Μεγάλη Βρετανία



Σταθερότητα διαλυμάτων

		10 mg/ml	2-8°C		28			754
		10 mg/ml	2-8°C		14			4279
		10 mg/ml	2-8°C		14			4279
		10 mg/ml	2-8°C		30			4292
		10 mg/ml	23-27°C		14			4292
		10 mg/ml	25°C		7			4003
		10 mg/ml	25°C		7			4049
		10 mg/ml	4°C		35			3137
		10 mg/ml	5°C		60			4003
		10 mg/ml	5°C		14			4049
		50 mg/ml	4°C		35			3137

PVC		0.4 mg/ml	4°C		14				3333
PE		0,4 mg/ml	2-8°C		30				4292
PE		0,4 mg/ml	23-27°C		30				4292
PE		0,96 mg/ml	25°C		7				4003
PE		0,96 mg/ml	5°C		7				4003
PE		1,2 mg/ml	25°C		7				4003
PE		1,2 mg/ml	5°C		7				4003
PE		1,6 mg/ml	25°C		7				4003
PE		1,6 mg/ml	5°C		7				4003
PE		4 mg/ml	2-8°C		30				4292
PE		4 mg/ml	23-27°C		30				4292
POF		0,4 mg/ml	2-8°C		14				4279
POF		0,4 mg/ml	2-8°C		14				4279
POF		0,7 mg/ml	22°C		30				3317
POF		0,7 mg/ml	25°C		7				3924
POF		0,7 mg/ml	4°C		30				3317
POF		0,7 mg/ml	4°C		7				3924
POF		0.4 mg/ml	25°C		30				4049
POF		0.4 mg/ml	5°C		90				4049
POF		0.6 & 0.84 & 1.88 mg/ml	2-8°C		7				3825
POF		0.6 & 0.84 & 1.88 mg/ml	25°C		7				3825
POF		1,6 mg/ml	22°C		30				3317
POF		1,6 mg/ml	25°C		7				3924
POF		1,6 mg/ml	4°C		30				3317
POF		1,6 mg/ml	4°C		7				3924
POF		2 mg/ml	2-8°C		14				4279
POF		2 mg/ml	2-8°C		14				4279
POF		2 mg/ml	25°C		30				4049
POF		2 mg/ml	5°C		90				4049
?		< 4 mg/ml	2-8°C		28				754



Συμβατότητες

		Infliximab Temocilline		2296
		Infliximab		754



Τρόπος χορήγησης



Βιβλιογραφία

	ΤΥΠΟΣ	δημοσίευση
754	Εργαστήριο	Infliximab (Remicade®) – Summary of Product Characteristics Merck Sharp & Dohme 2019
2296	Εργαστήριο	Témocilline (Negaban®) - Résumé des caractéristiques du produit Eumedica 2017
3137	εφημερίδα	Beer PM, Wong SJ, Schartman JP, Kulas KE, Hartman CL, Giganti M, Falk NS. Infliximab stability after reconstitution, dilution, and storage under refrigeration. Retina 2010 ; 30, 1: 81-84.
3317	αφίσα	Guirao S, Paul M, Jaccoulet E, Morand K, Astier A. Stabilité de l'infliximab en solutions diluées. APHIF Congress 2009
3333	εφημερίδα	Ikeda R, Vermeulen L.C, Lau E, Jiang Z, Saha S, Reichelderfer M, Kolesar J.M. Stability of infliximab in polyvinyl chloride bags. Am J Health-Syst Pharm 2012 ; 69:1509-1512.
3825	εφημερίδα	Young B.L, Ali Khan M, Chapman T.J, Parry R., Connolly M.A, Watts A.G. Evaluation of the physicochemical and functional stability of diluted REMSIMA(R) upon extended storage—A study compliant with NHS (UK) guidance. J Pharm Pract and Res 2015 ; 496: 421-431.
3924	εφημερίδα	Vieillard V, Astier A, Sauzay C, Paul M. One-month stability study of a biosimilar of infliximab (Remsima®) after dilution and storage at 4 C and 25 C. Ann Pharm Fr 2016 ; 75, 1 : 17-29.
4003	εφημερίδα	Kim J, Chung J, Park S, Jung S, Kang D. Evaluation of the physicochemical and biological stability of reconstituted and diluted SB2 (infliximab). EJHP 2017 ; 25, 3: 157-164.
4049	εφημερίδα	Tokhadze N, Chennell P, Le Basle Y, Sautou V. Stability of infliximab solutions in different temperature and dilution conditions. J Pharm Biomed Anal 2018 ; 150 : 386-395
4279	εφημερίδα	Hermosilla J, Sanchez-Martin R, Pérez-Robles R, Salmeron-Garcia A, Casares S, Cabeza J, Cuadros-Rodriguez L, Navas N. Comparative Stability Studies of Different Infliximab and Biosimilar CT-P13 Clinical Solutions by Combined Use of Physicochemical Analytical Techniques and Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA). Bio Drugs 2019 ; 33: 193–205.

4292	εφημερίδα	Vimpolsek M, Gottar-Guillier M, Rossy E. Assessing the Extended In-Use Stability of the Infliximab Biosimilar PF-06438179/GP1111 Following Preparation for Intravenous Infusion. Drugs R D 2019 19: 127–140.
------	-----------	--

Stabilis



Infliximab



Σταθερότητα και συμβατότητα των φαρμάκων

?		Καρβοξυμεθυλοκυτταρινικό νάτριο 50 mg Βορικό οξύ CaCl ₂ MgCl ₂ KCl Υδωρ για ενέσιμα >> 10 ml	-20°C	?	45			3754
?		Καρβοξυμεθυλοκυτταρινικό νάτριο 50 mg Βορικό οξύ CaCl ₂ MgCl ₂ KCl Υδωρ για ενέσιμα >> 10 ml	4°C	?	45			3754



Βιβλιογραφία

3754	εφημερίδα	δημοσίευση
		Robert M.C, Spurr-Michaud S, Frenette M, Young D, Gipson Ilene K, Dohlman Claes H. Stability and In Vitro Toxicity of an Infliximab Eye Drop Formulation. Int J Pharm Compound 2014 ;18, 5: 418-426.



Λεξικό

	Ανοσοκατασταλτικό		Ενέσιμο
	Εμπορική ονομασία		Σταθερότητα διαλυμάτων
	Υποδοχέας		Μόριο Μόριο
	Συγκέντρωση		Θερμοκρασία
	Αποθήκευση		Διάρκεια σταθερότητας
	βιοϊσοδύναμα		αντικρουόμενα δεδομένα
	Βιβλιογραφία		Υαλος
	Ενέσιμο ύδωρ		Απροσδιόριστο
	Ημέρα		Προστατεύετε από το φως
	Πολυβινυλοχλωρίδιο		Χλωριούχο νάτριο 0,9%
	Πολυαιθυλένιο		Πολυολεφίνη
	Φως		Απροσδιόριστο
	Συμβατότητες		Συστατικό
	Διαλυτικό		Απροσδιόριστη ασυμβατότητα
	Ασύμβατες		Σύμφωνος
	Τρόπος χορήγησης		Ενδοφλέβια έκχυση
	Βιβλιογραφία		Οφθαλμικές σταγόνες
	Σταθερότητα και συμβατότητα των φαρμ		Origine
	Έκδοχο		Φιαλίδιο φαρμάκου για ένεση
	Λεξικό		