


Stabilis



Insulin glulisine



Noms commerciaux

Apidra	Allemagne, Autriche, Belgique, Brésil, Canada, Chili, Colombie, Danemark, Egypte, Emirats Arabes Unis, Equateur, Espagne, Etats Unis d'Amérique, Finlande, France, Grande Bretagne, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Japon, Luxembourg, Maroc, Norvège, Nouvelle Zélande, Pays bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Suède, Suisse, Turquie
Shorant	Mexique



Stabilité des solutions

POF		1 U/ml	25°C	?	48			3935



Stabilité en mélange

POF		1 U/ml	25°C	?	Potassium chloride : 0.04 mEq/l	48		3935



Facteur influençant la stabilité

				3935
--	--	--	--	------



Compatibilités

		Insulin glulisine : 1 U/ml Imipenem-Cilastatin / Relebactam : 5 mg/ml		4433
		Insulin glulisine		3935



Voie d'administration





































Bibliographie

	Type	Source
3935	Laboratoire	Insuline glulisine (Insulines Sanofi Apidra®) - Résumé des caractéristiques du produit Sanofi Laboratoire 2016
4433	Revue	Ghazi I.M, El Nekidy W.S, Sood A, Dulku A, Patel R, Patel K. Y-site Administration of Imipenem/Cilastatin/ Relebactam With Common Intravenous Medications Clin Ther 2020 ; 42, 3: 475-485.



Dictionnaire

 Hypoglycémiant	 Injectable
 Noms commerciaux	 Stabilité des solutions
 Contenant	 Molécule
 Concentration	 Température
 Conservation	 Durée de stabilité
 Biosimilaire	 Données conflictuelles
 Bibliographie	 Polyoléfine
 Chlorure de sodium 0,9%	 Non précisée
 Heure	 Stabilité en mélange
 Solvant	 Molécule
 Facteur influençant la stabilité	 Glucose 5%
 Provoque	 Dégradation
 Compatibilités	 Modification du pH > 1 unité pH
 Incompatible	 NaCl 0,9% ou glucose 5%
 Incompatibilité non précisée	 Voie d'administration
 Intraveineuse	 Sous cutanée
 Bibliographie	 Dictionnaire