



Stabilis



Ornidazole



Tên thương mại

Betiral	Hồ Lô
Dazolic	Ấn Độ
Ornidazole	Ấn Độ, Argentina
Orniject	Thổ Nhĩ Kỳ
Tiberal	Bỉ, Colombia, Ecuador, Luxembourg, Morocco, Pháp, Thụy Sĩ, United Arab Emirates
Tibersid	Thổ Nhĩ Kỳ



Tính ổn định của các dung dịch

PVC	▲	10 mg/ml	25°C		15			918
PVC	▲	4 mg/ml	25°C		30			918
PVC	▲	4 & 10 mg/ml	25°C		30			918
PVC	▲	4 & 10 mg/ml	5°C		30			918
PVC	◆	10 mg/ml	25°C		30			918
PVC	◆	4 mg/ml	25°C		15			918
PVC	◆	4 & 10 mg/ml	25°C		30			918
PVC	◆	4 & 10 mg/ml	5°C		30			918



Khả năng tương thích

☒ Ornidazole : 31.25 mg/ml ☒ Cefotaxime sodium : 83.3 mg/ml	▲◆	4254
☒ Ornidazole : 31.25 mg/ml ☒ Heparin sodium : 208 UI/ml	▲	4254

	Ornidazole : 31.25 mg/ml Insulin : 1 UI/ml		4254
	Ornidazole		5020
	Ornidazole		5020
	Ornidazole : 166.67 mg/ml Sugammadex : 100 mg/ml		3372



Đang dùng



Tài liệu tham khảo

	Loại	Nguồn
918	Tạp chí	Rodriguez-Sasiain JM, Prieto M, Errecalde F, Jaio N, Martinez-Bengoechea MJ. Stability of ornidazole in PVC bags under various storage conditions. EJHP 1994 ; 4: 17-19.
3372	Tạp chí	Hanci V, Ali Kiraz H, Ömür D, Ekin S, Uyan B, Yurtlu B.S. Precipitation in Gallipoli: Sugammadex / Amiodarone & Sugammadex / Dobutamine & Sugammadex / Protamine. Rev Bras Anesthesiol 2013 ; 63, 1: 163-166.
4254	Tạp chí	D'Huart E, Vigneron J, Demoré B. Physical Compatibility of Intravenous Drugs Commonly Used in Intensive Care Units: An Observational Study and Physical Compatibility Laboratory Tests on Anti-Infective Drugs Pharmaceutical Technology in Hospital Pharmacy 2019 ;4,1:29-40
5020	Thông tin của nhà sản xuất	TIBERAL 1 g, solution injectable pour perfusion - Résumé des caractéristiques du produit. SERB Laboratory 2023



T_đ điển

	Kháng sinh		Dạng tiêm
	Tên thương mại		Tính ổn định của các dung dịch
	Bao bì		Phân tử
	Nồng độ		Nhiệt độ
	Bảo quản		Thời gian ổn định
	biosimilar		độ liệu mâu thuẫn
	Mục lục		Nhựa a polyvinyl chloride
	NaCl 0,9%		Ánh sáng
	Ngày		Tránh ánh sáng
	Glucose 5%		Khả năng thích ứng thích
	Phân tử		Dung môi
	Thích ứng thích		NaCl 0,9% hoặc Glucose 5%
	Không		Đóng gói dùng
	Truyền tĩnh mạch		Tài liệu tham khảo
	T _đ điển		