


Stabilis



Thioguanine



Stabilité des préparations

		200 mg Lanvis®	Methylcellulose 1% - 3.33 ml Sirop simple >> 10 ml	19-23°C		63		3202
		200 mg Lanvis®	OraPlus® 3.33 ml Orasweet ® >> 10 ml	19-23°C		63		3202
		200 mg Lanvis®	OraPlus® 3.33 ml Acide ascorbique 10 mg Orasweet ® >> 10 ml	19-23°C		63		3202
		375 mg ® = ?	SyrSpend SF PH4® >> 150 mL	2-8°C		90		4408
		375 mg ® = ?	SyrSpend SF PH4® >> 150 mL	20-25°C		90		4408



Facteur influençant la stabilité

	Acide ascorbique			3202
--	------------------	--	--	------




















Bibliographie

	Type	Source
3202	Revue	Montazeri Aliabadi H, Romanick M, Somayaji V, Mahdipoor P, Lavasanifar A Stability of compounded thioguanine oral suspensions Am J Health-Syst Pharm 2011 ; 68: 900-908.
4408	Revue	Polonini H, Loures da Silva S, Neves Cunha C, de Oliveira Ferreira A, Anagnostou K, Dijkers E. Stability of Azathioprine, Clonidine Hydrochloride, Clopidogrel Bisulfate, Ethambutol Hydrochloride, Griseofulvin, Hydralazine Hydrochloride, Nitrofurantoin, and Thioguanine Oral Suspensions Compounded with SyrSpend SF PH4. Int J Pharm Compound 2020 ;24,3:252-262



Dictionnaire

 Anticancéreux	 Solution buvable
 Stabilité des préparations	 Contenant
 Origine	 Excipient
 Température	 Conservation
 Durée de stabilité	 Biosimilaire
 Données conflictuelles	 Bibliographie
 Verre	 Comprimés
 A l'abri de la lumière	 Jour
 Flacon plastique	 Facteur influençant la stabilité
 Provoque	 Augmentation stabilité
 Bibliographie	 Dictionnaire