


Stabilis



Urokinase



Noms commerciaux

Abbokinase	Autriche, Chili, Espagne, Etats Unis d'Amérique, Suède
Actosolv	Belgique, France, Italie, Luxembourg
Alfakinasi	Italie
Angikinase	Egypte
Corase	Allemagne
Dabunase	Inde
Dukinase	Inde
KD Unase	Inde
Kisolv	Italie
Lynlitic	Canada
Medacinase	Pays bas
Persolv	Italie
Rheotromb	Allemagne
Syner-Kinase	Grande Bretagne
Ukidan	Grèce
Urochinasi	Italie
Urokinasa	Pologne
Urokinase	Allemagne, Autriche, Espagne, Luxembourg, Malaisie, Nouvelle Zélande, Pays bas, Suisse
Uroquidan	Espagne
Uroquinasa	Chili



Stabilité des solutions

		0,005 MUI/ml	22-25°C		24			375
		0,0025 > 0,025 MUI/ml	-30°C		30			1941
		0,005 MUI/ml	-20°C		182			1061
		0,005 MUI/ml	22-25°C		24			375
		0,005 MUI/ml	-20°C		56			2050
		0,005 MUI/ml	37°C		56			2050
		0,005 MUI/ml	7°C		56			2050



Facteur influençant la stabilité

				1394
				1395



Voie d'administration



Bibliographie

	Type	Source
375	Revue	Patel JP, Tran LT, Sinai WJ, Carr LJ. Activity of urokinase diluted in 0.9% sodium chloride injection or 5% dextrose injection and stored in glass or plastic syringes. Am J Hosp Pharm 1991 ; 48: 1511-1514.
1061	Revue	Rhoney DH, Coplin WM, Zaran FK, Brish LK, Weingarten CM. Urokinase after freezing : Implications for thrombolysis in intraventricular hemorrhage. Am J Health-Syst Pharm 1999 ; 56: 2047-2051.
1394	Revue	Zimmermann R, Sch?ffel G, Harenberg J. Urokinase therapy: dose reduction by administration in plastic material. Thromb Haemost 1981 ; 45: 296.
1395	Revue	Toki N, Sumi H. Glass adsorption of highly purified urokinase. Thromb Haemost 1980 ; 43: 67.
1941	Revue	Dedrick SC, Ramirez-Rico J. Potency and stability of frozen urokinase solutions in syringes. Am J Health-Syst Pharm 2004 ; 61: 1586-1589.
2050	Revue	Kohles JD, Weld M, Asa?d H, Gunning P, Reid Sterrett J, Debari VA. Stability of reconstituted urokinase solutions. Current Ther Res 2000 ; 61: 1-6



Dictionnaire

 Thrombolytique	 Injectable
 Noms commerciaux	 Stabilité des solutions
 Contenant	 Molécule
 Concentration	 Température
 Conservation	 Durée de stabilité
 Biosimilaire	 Données conflictuelles
 Bibliographie	 Verre
 NaCl 0,9% ou glucose 5%	 Lumière
 Heure	 Seringue polypropylène
 Eau pour préparation injectable	 A l'abri de la lumière
 Jour	 Chlorure de sodium 0,9%
 Non précisée	 Facteur influençant la stabilité
 Provoque	 Adsorption
 Voie d'administration	 Intraveineuse
 Perfusion intraveineuse	 Bibliographie
 Dictionnaire	